

Esimerkkejä lääkkeitä, jotka voivat aiheuttaa valoihottumaa (suluissa lääkkeiden kauppanimiä)

Mikrobilääkkeet

- Tetrasykliini, doksisykliini (*Apocydin, Apodoxin, Dasyklin, Doximed, Doximycin, Doxitin, Oricyclin*)
- Kinoloniryhmä: moksifloksasiini, norfloksasiini, ofloksasiini, siprofloksasiini (*Avelox, Ciprofloxacin, Cipromed, Ciproxin, Lexinor, Norfloxacin, Siprion, Tarivid, Tavanic*)
- Sulfonamidit, sulfa-trimetopriimi (*Cotrim, Ditrim, Trimetin*)

Psykoosilääkkeet

- Klooripromatsiini (*Klorproman*)
- Promatsiini, levomepromatsiini (*Levozin, Nozinan, Sparine*)
- Flufenatsiini (*Pacinol, Squalone*)
- Perfenatsiini (*Peratsin*)

Sydän- ja verenpainetautilääkkeet

- Tiatsididiureetit (*Hydrex*)
- Furosemiidi (*Furesis, Furomin, Lasix, Vesix*)
- Amiodaroni (*Cordarone*)
- Kinidiini (*Kiniduron*)

Tulehduskipulääkkeet

- Piroksikaami (*Brexidol, Felden, Piroxal*)
- Tenoksikaami (*Tilcotil*)

Ihotautilääkkeet

- Isotretinoiini (*Isotretinoin, Roaccutan*)
- Asitretiini (*Neotigason*)

Paikallisesti käytettävät lääkkeet

- Paikalliset tulehduskipulääkegeelit (*Algesal, Felden, Nimed, Orudis, Piroxin, Voltaren, Zon*)
- Tervaa sisältävät valmisteet (*Alphosyl*)
- Bentsoyyliperoksidi (*Basiron, Brevoxyl*)
- Tretinoiini (*Avictid*)

Rohdosvalmisteet

- Mäkikuisma

Valoherkistymistä voivat aiheuttaa myös mm. trisykliset masennuslääkkeet, neurologisista lääkkeitä amantadiini, fenytoiini ja karbamatsepiini sekä solunsalpaajista fluorourasiili, metotreksaatti ja vinblastiini.